

Ell-Cranell® alpha

Wirkstoff: Alfatradiol

LÖSUNG

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Zusammensetzung

1 ml Ell-Cranell® alpha enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil: 0,25 mg Alfatradiol.
Sonstige Bestandteile: 2-Propanol, Glycerol 85%, Inositol, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Ell-Cranell® alpha ist als Lösung in Flaschen zu 100 ml und 2 x 100 ml (jeweils mit Kopfhaut-Applikator) erhältlich.
Ell-Cranell® alpha ist ein Mittel zur äußeren Anwendung auf der Kopfhaut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Galderma Laboratorium GmbH
Georg-Glock-Straße 8
D-40474 Düsseldorf
www.galderma.de

Anwendungsgebiete

Zur Steigerung der verminderten Anagenhaarrate bei der

leichten androgenetischen Alopecie (hormonell bedingter Haar- ausfall) bei Männern und Frauen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Ell-Cranell® alpha nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei Personen unter 18 Jahren liegen keine Erfahrungen vor.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Spezielle Erfahrungen mit der Anwendung von Ell-Cranell® alpha in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Nur zur äußeren Anwendung, nicht in die Augen und auf die Schleimhäute bringen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Ell-Cranell® alpha nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Ell-Cranell® alpha sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft sollten Sie Ell-Cranell® alpha anwenden?


Ell-Cranell® alpha wird einmal täglich angewendet, am besten abends. Nach Besserung des Haarausfalles bzw. der Krankheitserscheinungen kann die Anwendung auf jeden zweiten bis dritten Tag verringert werden. Dies ist frühestens nach einem Monat zu erwarten.

Wie sollten Sie Ell-Cranell® alpha anwenden?


Nur zur äußeren Anwendung, nicht in die Augen und auf die Schleimhäute bringen. Ell-Cranell® alpha wird mittels Kopfhaut-Applikator direkt auf die Kopfhaut bzw. auf die erkrankten Stellen aufgetragen. Dazu den Kopfhaut-Applikator etwa 1 Minute lang gleichmäßig auf der Kopfhaut entlangführen (Streichbewegungen), so daß ca. 3 ml der Lösung auf die Kopfhaut gelangen.

Die Anwendung mit dem Kopfhaut-Applikator ist sehr einfach:


1. Verschluß der Flasche abdrehen, Kopfhaut-Applikator aufschrauben und bis zum Anschlag festdrehen.




2. Die Flasche am Sockel festhalten und den Applikator – durch das Haar – direkt auf die Kopfhaut bzw. auf die erkrankte Stelle aufsetzen.




3. Durch die kleinen, kaum sichtbaren Austrittsöffnungen am Applikator fließt das Arzneimittel heraus.



4. Den Applikator leicht auf der Kopfhaut bzw. den zu behandelnden Stellen entlangführen. Das Arzneimittel kann bequem aufgetragen werden. Die Flüssigkeit läuft nicht herunter, die Frisur bleibt erhalten.



5. Zum Transport oder auf Reisen den Applikator abschrauben und den Verschluß auf die Flasche aufdrehen, damit die Lösung nicht ausläuft.



Wie lange sollten Sie Eil-Cranell®alpha anwenden?

Es liegen keine klinischen Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Verträglichkeit bei längerer Anwendung als 1 Jahr vor. Eine längere Anwendung darf deshalb nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen. Es wurde nicht untersucht, wie lange die Wirkung des Präparates nach Absetzen anhält.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Eil-Cranell®alpha auftreten?

Aufgrund des Alkoholanteils kann ein kurzfristiges Brennen oder Rötung und Juckreiz auf der Kopfhaut auftreten. Während der Anwendungszeit kann die Kopfhaut eher fettiger als trocken werden. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist außen aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information
August 2004

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

GALDERMA 

GI/3216/b
Druckfreigabe im Februar 2005