

Wichtige Gebrauchsinformation. Vor Anwendung aufmerksam lesen!

Colchicum Hevert® Complex

Homöopathisches Arzneimittel
bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

Colchicum Hevert Complex

Mischung

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung rheumatischer Beschwerden.

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Gegenanzeigen

Wann darf Colchicum Hevert Complex nicht eingenommen werden? Obwohl bisher keine Hinweise auf eine fruchtschädigende Wirkung von Colchicum Hevert Complex bekannt wurden, sollte das Arzneimittel aufgrund des Inhaltsstoffes Colchicum in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Enthält 54 Vol.-% Alkohol.

Was ist bei Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aufgrund des Inhaltsstoffes Colchicum soll das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Wie bei allen Arzneimitteln kann die Wirkung durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere für homöopathische Arzneimittel. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wie viel von Colchicum Hevert Complex und wie oft sollte Colchicum Hevert Complex eingenommen werden?

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde höchstens 12-mal täglich, je 5–10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3-mal täglich 5–10 Tropfen einnehmen. Die Dosierung bei Kindern erfolgt nach Anweisung des Arztes. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollte Colchicum Hevert Complex eingenommen werden? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und Umkarton angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Wie ist Colchicum Hevert Complex aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern!

Arzneimittel: Stets vor Kindern geschützt aufbewahren!

Zusammensetzung

10 ml enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Berberis	Dil. D2	0,5 ml
Colchicum	Dil. D3	1,0 ml
Ledum	Dil. D4	2,0 ml
Phytolacca	Dil. D2	0,5 ml
Spiraea ulmaria	Dil. D4	0,5 ml
Sulfur	Lösung D4	0,5 ml
Thuja occidentalis	Dil. D4	0,5 ml

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43% (m/m)

1 ml entspricht ca. 38 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgrößen

50 ml N1 / 100 ml N2 Mischung zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

In der Weiherwiese 1

D-55569 Nussbaum

Stand der Information

Oktober 2006

Hinweis: Trübungen bzw. vorhandener Bodensatz rühren von den in Naturheilmitteln enthaltenen hohen Anteilen an Pflanzeninhaltsstoffen her und haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit. Dieser eventuell vorhandene Bodensatz lässt sich durch Schütteln fein verteilen.

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Dosierhinweis



Liebe Patientin, lieber Patient!

Um eine genaue Dosierung zu gewährleisten, halten Sie bitte die Flasche in einem Winkel von ca. 20–25°.