

Gebrauchsinformation

Pulmotin® Inhalat, 10 g/10 g, Ätherisches Öl

Wirkstoff: Eukalyptusöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Pulmotin® Inhalat jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Pulmotin® Inhalat und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Pulmotin® Inhalat beachten?
3. Wie ist Pulmotin® Inhalat anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pulmotin® Inhalat aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Pulmotin® Inhalat und wofür wird es angewendet?

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Pulmotin® Inhalat ist reines Eukalyptusöl zur Behandlung von Atemwegserkrankungen

Anwendungsgebiete

Pulmotin® Inhalat wird angewendet zur äußerlichen und innerlichen Anwendung bei Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Pulmotin® Inhalat beachten?

Pulmotin® Inhalat darf nicht angewendet werden,

- bei Überempfindlichkeit gegen Eukalyptusöl sowie bei Asthma bronchiale und Keuchhusten.
- Nicht bei Kindern unter 2 Jahren anwenden.

Innerliche Anwendung:

Wenden Sie Pulmotin® Inhalat nicht bei entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich und im Bereich der Gallenwege sowie bei schweren Lebererkrankungen an.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Pulmotin® Inhalat ist erforderlich:

Bei Säuglingen und Kleinkindern tragen Sie Pulmotin® Inhalat bitte nicht im Bereich des Gesichtes, speziell der Nase, auf und verwenden Sie es in dieser Altersgruppe nicht zur Inhalation.

Bei Anwendung von Pulmotin® Inhalat mit anderen Arzneimitteln

Eukalyptusöl bewirkt eine Anregung des fremdstoffabbauenden Enzymsystems in der Leber. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann deshalb abgeschwächt und/oder verkürzt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine Untersuchungen zur Anwendung von Eukalyptusöl in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, verzichten Sie sicherheitshalber während dieser Zeit auf Pulmotin® Inhalat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Pulmotin® Inhalat anzuwenden?

Wenden Sie Pulmotin® Inhalat immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Art der Anwendung

Zur Inhalation geben Sie 3–4 Tropfen Eukalyptusöl in heißes Wasser.

Bei äußerlicher Anwendung gegen Erkältungskrankheiten der Luftwege werden einige Tropfen Eukalyptusöl auf Brust- und Rückenhaut verrieben.

Bei innerlicher Anwendung werden 3 mal täglich 2 bis 4 Tropfen Eukalyptusöl auf Zucker oder in einem Glas warmem Wasser eingenommen.

Dauer der Anwendung

Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, empfehlen wir Ihnen mit einem Arzt Rücksprache zu nehmen.

Überdosierungserscheinungen sind uns nicht bekannt.

Bei Spritzen oder Verreiben in die Augen spülen Sie bitte mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Pulmotin® Inhalat Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt.

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Selten wird nach Einnahme von Eukalyptusöl Übelkeit, Erbrechen und Durchfall beobachtet. Bronchospasmen, eine Verkrampfung der Luftröhrenmuskulatur, können verstärkt werden. Durch das im Pulmotin® Inhalat enthaltene ätherische Öl können an Haut und Schleimhäuten verstärkte Reizerscheinungen auftreten. Eine vorübergehende Rötung am behandelten Hautareal ist unbedenklich.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Pulmotin® Inhalat aufzubewahren?

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen

Bewahren Sie bitte Pulmotin® Inhalat vor Licht geschützt und dicht verschlossen auf.

6. Weitere Informationen

Was Pulmotin® Inhalat enthält:

10,0 g enthalten: Wirkstoff: Eukalyptusöl 10,0 g

Inhalt der Packung:

Flasche zu 20 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Serumwerk Bernburg AG, Hallesche Landstraße 105 b, 06406 Bernburg

Tel.: 03471 / 86 00

Fax: 03471 / 86 04 08

Die Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2007.