

**Gebrauchsinformation**  
bitte sorgfältig lesen!

# Cuprum / Tabacum

## Salbe

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

### Zusammensetzung

10 g enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Cuprum metallicum praeparatum M D1 0,2 g / Tabacum Dil. D5 [D3 mit Ethanol 43% (m/m), D4 mit Ethanol 30% (m/m), D5 mit Ethanol 15% (m/m)] 0,5 g.

Salbengrundlage: Dickflüssiges Paraffin, Protegin-Salbengrundlage Goldschmidt [Dünnflüssiges Paraffin, weißes Vaselin, Paraffine (Fp 100 - 120°C), Glycerolalkanoat], Gelbes Vaselin, Gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Packungsgröße

25 g Salbe

Weleda AG

Postfach 1309/1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen

Keine bekannt

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

#### *Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Bei Kindern unter 12 Jahren soll Cuprum / Tabacum Salbe nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

#### *Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Wie alle Arzneimittel sollte Cuprum / Tabacum Salbe in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

### **Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 2 mal täglich auf die Haut auftragen oder als Salbenverband anwenden.

Zur Anwendung als Salbenverband wird ein Stück Leinen- oder Baumwollstoff dünn mit der Salbe bestrichen, mit der Salbenseite über den betroffenen Stellen aufgelegt und befestigt.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### **Dauer der Anwendung**

Die Dauer der Behandlung erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

### **Nebenwirkungen**

Keine bekannt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

### **Hinweis**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

**Stand der Information:** Januar 2006