



Enzym
Lefax forte
Pankreatin
KAPSELN

Magensaftresistente Hartkapseln
mit 20.000 Ph.Eur.-Einheiten Pankreas-Pulver vom Schwein

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder Krankheitssymptome auftreten, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln beachten?
3. Wie ist Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ENZYM LEFAX FORTE PANKREATIN KAPSELN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln ist ein Arzneimittel mit Verdauungsenzymen.

Es wird angewendet zum Ersatz von Verdauungsenzymen bei Verdauungsstörungen (Maldigestion) infolge ungenügender oder fehlender Funktion der Bauchspeicheldrüse (exokrine Pankreasinsuffizienz).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ENZYM LEFAX FORTE PANKREATIN KAPSELN BEACHTEN?

Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln darf nicht eingenommen werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln ist erforderlich:

Sie sollten Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln bei akuter Pankreasentzündung (Pankreatitis) und bei einem akuten Schub einer chronischen Pankreasentzündung während der Haupterkrankungsphase nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.

In der Abklingphase der Pankreasentzündung während einer entsprechenden Diät ist gelegentlich die Einnahme von Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln bei Hinweisen auf eine weiterhin bestehende Störung der Pankreasfunktion sinnvoll.

Schwangerschaft und Stillzeit

Sie können Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln in der

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Kapseln während jeder Mahlzeit unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (etwa 1 Glas Wasser) ein.

Patienten, die die ganze Kapsel nicht schlucken können, können diese durch Auseinanderziehen öffnen und nur die magensaftresistenten Mikrotablets unzerkaut schlucken.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung ist nicht eingeschränkt und richtet sich nach dem Krankheitsbild.

Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln eingenommen haben als Sie sollten?

Überdosierungen sind bisher nicht bekannt geworden.

Was ist zu tun, wenn Sie zu wenig Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Nehmen Sie bei der nächsten Einnahme nicht die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Einnahme wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp (wie z. B. Hautausschlag, Niesen, Tränenfluss, Atemnot) sowie Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) des Verdauungstraktes nach Einnahme von Pankreatin beobachtet worden.

Nach Gaben hoher Dosen von Pankreatinpräparaten sind bei Patienten mit Mukoviszidose, einer angeborenen Stoffwechselstörung, in Einzelfällen die Bildung von Verengungen der Krummdarm- (Blinddarmregion und der aufsteigenden Dickdarmabschnitte (Colon ascendens)) beschrieben worden. Diese Verengungen können unter Umständen zu einem Darmverschluss führen.

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen sollten

Sie das Medikament absetzen und sich sofort in ärztliche Betreuung begeben.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ENZYM LEFAX FORTE PANKREATIN KAPSELN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln sollen nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr eingenommen werden.

Die Packung ist nach Anbruch 4 Monate haltbar!

Nicht über 25 °C lagern!

6. WEITERE INFORMATIONEN

Zusammensetzung

Der Wirkstoff ist Pankreas-Pulver vom Schwein.

1 Hartkapsel mit magensaftresistenten Mikrotablets enthält:

Pankreas-Pulver vom Schwein 195,20 mg, entspricht: Lipaseaktivität: 20.000 Ph.Eur.-Einheiten
Amylaseaktivität: mindestens 15.000 Ph.Eur.-Einheiten
Proteaseaktivität: mindestens 900 Ph.Eur.-Einheiten

Die sonstigen Bestandteile sind: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Dispersion 30%, Crospovidon, Gelatine, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), mikrokristalline Cellulose, Montanglycolwachs, Smeticon-Emulsion 23%, Talkum, Triethylcitrat, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser, Farbstoff E 171.

Darreichungsform und Inhalt

Enzym Lefax forte Pankreatin Kapseln sind in Braunglasflaschen mit 50, 100 oder 200 Hartkapseln mit magensaftresistenten Mikrotablets erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland

Hersteller

Bayer Pharma AG

Betrieb: 51368 Leverkusen, Deutschland

Stand der Information

März 2012

Bayer