

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient. Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Strophactiv®

Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung

10 g enthalten:

g-Strophantin Dil. D 4 = Ouabainum Dil. D 4 10,0 g;

1 g entspricht 30 Tropfen

Enthält 18,5 Vol.% Alkohol

Flüssige Verdünnung

50 ml

zum Einnehmen

magnet-activ GmbH

Bilogisch-pharmaz. Präparate

Postfach 1380

69154 Wiesloch

Tel.: 06222/59037

Fax: 06222/50215

Hersteller:

Weimer Pharma GmbH,

Im Steingerüst 30,

76437 Rastatt

### Anwendungsgebiet:

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion.

### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Strophactiv nicht anwenden?

Strophactiv ist bei Alkoholkranken und bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anzuwenden.

Wann dürfen Sie Strophactiv erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Strophactiv bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 18,5 Vol.% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Strophactiv in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

## **Wechselwirkungen**

Bisher keine bekannt

## **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch die allgemein schädigenden Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

## **Dosierung und Einnahmehinweise**

Soweit nicht anders verordnet, als Anfangsdosis alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, 15-20 Tropfen in kurzen Abständen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 2-3 mal täglich 15-20 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Bei der Einnahme soll die Flüssigkeit möglichst lange unter der Zunge gehalten werden.

## **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

## **Anwendungsfehler und Überdosierung**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden etwa 8 g Alkohol aufgenommen.

## **Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## **Hinweis:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

## **Hinweis**

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anzuwenden.

Stand: September 2004

