



# THYREO- Injektipas® SD

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle 2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Lycopus virginicus Dil. D2 4 mg, Ferrum iodatum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 6) 2 mg, Avena sativa Dil. D1 2 mg, Lupulus Dil. D1 2 mg.  
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

**Darreichungsform und Inhalt:** Flüssige Verdünnung zur Injektion in Originalpackungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2 ml.

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Homöopathisches Arzneimittel bei Schilddrüsenerkrankungen.

**Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:**

PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Gießen, Telefon (0641)7960-0, Telefax (0641)7960-109, e-mail: info@pascoe.de



**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Zur unterstützenden Behandlung bei Schilddrüsenüberfunktion mit Schlafstörungen.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Schilddrüsenerkrankungen sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung muss der Arzt unbedingt auf die Arzneimittelanwendung hingewiesen werden, da die Untersuchungsergebnisse sonst verfälscht werden können.

**Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie THYREO-Injektipas® SD nicht anwenden?*

THYREO-Injektipas® SD soll bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte THYREO-Injektipas® SD in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.





**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, 1 bis 2 mal wöchentlich 2 ml Injektionslösung intramuskulär, subcutan oder intravenös injizieren.

**Dauer der Anwendung:**

Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Hinweise: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf der Ampulle und äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**Datum der Fassung:** 22.10.2002