Gebrauchsinformation

ibutop® CREME

WIRKSTOFF: IBUPROFEN

Chefaro

Deutsche Chefaro Pharma GmbH,
Postfach 449, 45725 Waltrop

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ibutop® Creme jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- *Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.*
- *Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.*
- *Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 1 – 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.*

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist ibutop® Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ibutop® Creme beachten?
3. Wie ist ibutop® Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ibutop® Creme aufzubewahren?

ibutop® Creme **Creme**

Wirkstoff: Ibuprofen

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
100 g ibutop® Creme enthalten 5 g Ibuprofen in einer Öl/Wasser-Emulsion.

Sonstige Bestandteile:
Methyl-4-hydroxybenzoat-Natrium, mittelkettige Triglyceride, Glycerolmonostearat, Poly(oxyethylen)-30-stearat, Poly(oxyethylen) -100-stearat, 1,2-Propandiol, Xanthan-Gummi, Trinkwasser.

Darreichungsform und Inhalt

ibutop® Creme ist in Packungen mit 50 g, 75 g, 100 g und 150 g Creme erhältlich.

1. *Was ist ibutop® Creme und wofür wird sie angewendet?*

1.1 ibutop® Creme ist ein schmerzlinderndes und entzündungshemmendes Arzneimittel zum Auftragen auf die Haut

von

1.2 *Pharmazeutischer Unternehmer*
Deutsche Chefaro Pharma GmbH, Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop, Tel.: 0 23 09/ 6 40, Fax: 0 23 09 / 6 44 24

Hersteller
Pharbil Waltrop GmbH, Postfach 390, 45724 Waltrop,Tel.: 02309 / 93750, Fax: 0 23 09 / 9 37 53 92

1.3 ***ibutop® Creme* wird angewendet**

zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen Behandlung bei Muskelrheumatismus, degenerativen schmerzhaften Gelenkerkrankungen (Arthrosen), entzündlichen rheumatischen Erkrankungen der Gelenke und der Wirbelsäule, Schwellung bzw. Entzündung der gelenknahen Weichteile (z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Schultersteife, Kreuzschmerzen, Hexenschuss, Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen.

2. *Was müssen Sie vor der Anwendung von ibutop® Creme beachten?*

2.1 ibutop® Creme sollte nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber Ibuprofen oder anderen Stoffen des gleichen Wirkmechanismus. Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber 1,2-Propandiol und/oder dem Konservierungsmittel Methyl-4-hydroxybenzoat-Natrium sollten nicht mit ibutop® Creme behandelt werden. Patienten, die zu Allergien neigen, sollten nicht mit ibutop® Creme behandelt werden. Auf offene Wunden oder auf Schleimhäute darf ibutop® Creme nicht aufgetragen werden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ibutop® Creme ist erforderlich:

a) Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 14 Jahren wird nicht empfohlen.

b) Schwangerschaft und Stillzeit

Im letzten Drittel der Schwangerschaft darf ibutop® Creme nicht über einen längeren Zeitraum bzw. auf größeren Hautflächen angewendet werden, da systemische Wirkungen nicht auszuschließen sind. Dabei kann es zu einer Wehenhemmung und zu einer Steigerung der Blutungsneigung kommen. Obwohl es bisher keine Hinweise auf teratogene Wirkungen (Missbildungen) gibt, soll ibutop® Creme im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel nicht großflächig über längere Zeit angewendet werden. Während der Stillzeit soll ibutop® Creme nicht angewendet werden.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen von ibutop® Creme mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. *Wie ist ibutop® Creme anzuwenden?*

Wenden Sie ibutop® Creme immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

ibutop® Creme auf die Haut auftragen und leicht in die Haut einreiben. Bei starken Blutergüssen und Stauchungen kann zu Beginn der Behandlung die Anwendung eines luftdichten Verbandes von Nutzen sein. Ein verstärktes Eindringen des Wirkstoffes durch die Haut kann durch Anwendung der Iontophorese (eine besondere Form der Elektrotherapie) erreicht werden. Dabei ist ibutop® Creme unter der Kathode (Minuspol) aufzutragen. Die Stromstärke soll 0,1 - 0,5 mA pro 5 cm² Elektrodenoberfläche betragen, die Anwendungsdauer ca. 10 Minuten.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

3- bis 4-mal täglich, bei Bedarf auch öfter, einen 4 – 10 cm langen Creme-Strang auftragen und großflächig in die Haut einreiben. Die Behandlungsdauer bestimmt der Arzt. In den meisten Fällen ist eine tägliche Anwendung über 2 - 3 Wochen ausreichend.

4. *Welche Nebenwirkungen sind möglich?*

In seltenen Fällen können Hautrötungen, Jucken, Brennen, Hautausschlag auch mit Pustel- und Quaddelbildung auftreten.
In äußerst seltenen Fällen können bei entsprechend prädisponierten Patienten bronchospastische Reaktionen auftreten.
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. *Wie ist ibutop® Creme aufzubewahren?*

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nach Ablauf des Verfallsdatums darf ibutop® Creme nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information

Januar 2004

Vor der erstmaligen Anwendung ist die Schutzfolie an der Tubenöffnung mit dem in der Verschlusskappe eingelassenen Dorn zu durchstechen.

ibutop® ist auch als Gel erhältlich.