

# Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## SANUKEHL® Cand D6 Flüssige Verdünnung

Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: *Candida albicans e volumine cellulae D6*

### Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 ml **Candida albicans e volumine cellulae D6** dil. (HAB, Vorschrift 5a).

**Darreichungsform und Inhalt:** 10 ml (N1) / 100 ml (N2) flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben.



### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**SANUM-KEHLBECK**

GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen soll medizinischer Rat eingeholt werden.

### Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **SANUKEHL® Cand D6** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.


*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von **SANUKEHL® Cand D6**?*

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von **SANUKEHL® Cand D6** beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von vier Wochen einzuhalten.



**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **SANUKEHL® Cand D6** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, werden bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle zwei Tage eingenommen.

**SANUKEHL® Cand D6** kann auch in die Haut eingerieben werden; bei dieser Art der Anwendung werden alle ein bis zwei Tage 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeugen eingerieben.

*Wie lange sollten Sie **SANUKEHL® Cand D6** anwenden?*

Nach 8 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige Therapiepause eingelegt werden.

**Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **SANUKEHL® Cand D6** auftreten?*

Aufgrund des Gehaltes von **SANUKEHL® Cand D6** an spezifisch organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

In diesem Fall ist die Anwendung von **SANUKEHL® Cand D6** zu unterbrechen und gegebenenfalls symptomatisch zu behandeln. Wenn Sie Nebenwirkungsreaktionen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:** Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

**Stand der Gebrauchsinformation:** 01. 09. 2001.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!



Trennung  
an der abstehenden  
Lasche  
anlassen  
und runderhüm  
abziehen.



Weiße Schutzkappe  
mit Daumen und  
Zeigefinger  
kräftig anfassend  
und zur Seite  
abknicken.



Tropfenweise Ent-  
nahme durch vor-  
sichtiges Zusammen-  
drücken der Gummi-  
Platte mit Daumen  
und Zeigefinger



Nach Gebrauch  
Schutzkappe fest auf-  
drücken bis sie hörbar  
einrastet. Hierdurch  
dichter Verschluss der  
Tropfflasche.

