

## Advantage® Lösung zum Auftropfen für Katzen

### Antiparasitikum gegen Flöhe

**Zusammensetzung :**

1 ml Lösung enthält:

Wirkstoff: 10% Imidacloprid (100 mg/ml)

Sonstige Bestandteile: 0,1% (1 mg/ml)  
Butylhydroxytoluol (E321), Benzylalkohol

**Darreichungsform :**

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.  
Klare hellgelbe bis schwach bräunliche Lösung.

**Zieltierarten :**

Katze

**Anwendungsgebiete :**

Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls bei  
Katzen.  
Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen  
lang gegen Flöhe. Das Mittel kann als Teil einer  
Behandlungsstrategie bei allergischer Flohdermatitis  
verwendet werden.

## **Advantage® Lösung zum Auftropfen für Katzen**

<b>Gegenanzeigen :</b>	Unter 8 Wochen alte Saugwelpen nicht behandeln. Nicht anwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt.
<b>Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart :</b>	Keine
<b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :</b>	<u>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:</u>  Das Tierarzneimittel ist zur äußerlichen Anwendung vorgesehen und darf dem Tier nicht eingegeben werden. Augen- und Schleimhautkontakt beim Tier vermeiden. Der Tierhalter soll darauf achten, dass sich frisch behandelte Tiere nicht gegenseitig an der Auftragsstelle lecken.  <u>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:</u>  Nach Gebrauch Hände sorgfältig waschen. Auftretende Arzneimittelreste auf der Haut des Anwenders mit Wasser und Seife entfernen.  Personen mit bekannter Hautüberempfindlichkeit können bei Hautkontakt besonders empfindlich auf das Produkt reagieren. Augen- und Schleimhautkontakt vermeiden. Bei unbeabsichtigtem Augenkontakt sorgfältig mit Wasser ausspülen. Bei fortdauernder Haut- oder Augenreizung, oder bei unbeabsichtigtem Verschlucken der Lösung, ist ein Arzt zu konsultieren. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
<b>Nebenwirkungen :</b>	Advantage® schmeckt bitter. Daher kann das Ablecken der Applikationsstelle unmittelbar nach Auftragung der Lösung bei der Katze Speicheln verursachen. Dies ist kein Zeichen einer Vergiftung und klingt nach einigen Minuten ohne Behandlung wieder ab.
<b>Anwendung während Trächtigkeit und Laktation :</b>	In entsprechenden Untersuchungen mit dem Wirkstoff Imidacloprid an Ratten und Kaninchen ergaben sich keine Anzeichen primär embryotoxischer, teratogener oder reproductionstoxischer Wirkungen. Studien an trächtigen und laktierenden Katzen zusammen mit

## **Advantage® Lösung zum Auftropfen für Katzen**

ihren Welpen liegen erst in limitierter Zahl vor. Bisherige Beobachtungen lassen jedoch keine Unverträglichkeiten bei diesen Tieren erwarten.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln :**

Nach gleichzeitiger Gabe von Advantage® in der doppelten therapeutischen Dosierung mit folgenden in der Veterinärmedizin gebräuchlichen Arzneistoffen wurden keine Anzeichen klinischer Unverträglichkeit beobachtet: Lufenuron, Pyrantel und Praziquantel. Die Verträglichkeit von Advantage® unter Feldbedingungen mit einer Reihe von weiteren Routine-Therapien, einschließlich Vakzinierung, konnte ebenfalls gezeigt werden.

### **Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :**

Katze (kg KGW)	Arzneimittel	Anzahl Pipetten	Imidacloprid (mg/kg KGW)
< 4	Advantage® 40 für Katzen	1 x 0,4 ml	mind. 10
≥ 4	Advantage® 80 für Katzen	1 x 0,8 ml	mind. 10


Die Behandlung mit Advantage® erfolgt nach folgendem Dosierungsschema:

Eine Pipette aus der Packung entnehmen. Die kindergesicherte Verschlusskappe abziehen, umgekehrt aufdrücken und unter Drehen wieder abziehen. Die Pipette dabei senkrecht nach oben halten.



Der Katze mit zwei Fingern das Fell am Hinterkopf (im Nacken) so weit auseinanderteilen, bis die Haut sichtbar wird. Dann Advantage® durch mehrmaliges Ausdrücken der Pipette direkt auf die Haut auftragen. Die Pipette dabei senkrecht nach unten halten.

## **Advantage® Lösung zum Auftropfen für Katzen**



Advantage® schmeckt bitter. Daher kann das Ablecken der Applikationsstelle unmittelbar nach Auftragen der Lösung bei der Katze Speicheln verursachen. Dies ist kein Zeichen einer Vergiftung und klingt nach einigen Minuten ohne Behandlung wieder ab. Die korrekte Auftragung der Lösung direkt auf die Haut im Nacken kann das Ablecken der Auftragsstelle durch die Katze verhindern.

Advantage® soll nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden. Der Tierhalter soll darauf achten, dass sich frisch behandelte Tiere nicht gegenseitig an der Auftragsstelle lecken.

Das Schlüpfen von Flöhen in der Umgebung mit nachfolgender Reinfestation der Katze kann für mindestens 6 Wochen nach Behandlungsbeginn andauern. Um auch diese Flöhe zu erfassen, können in Abhängigkeit vom Flohdruck in der Umgebung des Tieres Wiederholungsbehandlungen mit Advantage® notwendig sein. Zur Unterstützung der Therapie wird empfohlen, auch das Lager der Tiere und die direkte Umgebung mit einem Präparat gegen adulte Flöhe und deren Entwicklungsstadien zu behandeln.

Nasswerden der Katze, z. B. nach heftigem Regen, beeinträchtigt die Wirksamkeit von Advantage® nicht. Allerdings kann, in Abhängigkeit vom Flohdruck in der Umgebung des Tieres, eine Wiederholung der Behandlung notwendig werden. Diese jedoch nicht häufiger als in wöchentlichen Abständen vornehmen.

### **Überdosierung :**

Die wöchentliche Behandlung mit der 5-fachen therapeutischen Dosis über 8 Wochen erbrachte keine Symptome klinischer Unverträglichkeit.  
Bei Überdosierung oder Ablecken der Applikationsstelle kann es in seltenen Fällen zu nervösen Beschwerden

## **Advantage® Lösung zum Auftropfen für Katzen**

(Zuckungen, Zittern, Ataxie, Pupillenerweiterung, Pupillenverengung, Lethargie) kommen. Das Auftreten von Vergiftungserscheinungen nach unbeabsichtigter oraler Aufnahme des Arzneimittels beim Tier ist unwahrscheinlich. In diesem Fall sollte eine symptomatische Therapie unter tierärztlicher Aufsicht erfolgen. Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt, jedoch kann die Verabreichung von Aktivkohle günstig sein.

<b>Wartezeit :</b>	Nicht zutreffend.
<b>Unverträglichkeiten :</b>	Keine bekannt.
<b>Dauer der Haltbarkeit des Tierarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses :</b>	Entfällt. Nach Öffnen der Pipette ist der gesamte Pipetteninhalt jeweils zu applizieren.
<b>Dauer der Haltbarkeit der gebrauchsfertigen Zubereitung :</b>	Entfällt. Advantage ist eine gebrauchsfertige Lösung.
<b>Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise :</b>	Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt aufbewahren.
<b>Art und Beschaffenheit des Behältnisses :</b>	Packung mit 4 Pipetten (Tuben) mit jeweils 0,4 bzw. 0,8 ml Lösung.  Pipette (Tube) aus weißem Polypropylen mit Kappen aus weißem Polypropylen. Sekundärverpackung: Blisterpackungen PCTFE/PVC verschweißt.
<b>Verschreibungsstatus :</b>	Apothekenpflichtig
<b>Zusätzliche Hinweise :</b>	Neuere Studien haben gezeigt, dass Imidacloprid neben seiner adultiziden Flohwirksamkeit auch eine Wirksamkeit gegen Flohlarven in der Umgebung des behandelten Tieres besitzt. Flohlarven in der Umgebung des Tieres werden abgetötet, wenn sie mit dem behandelten Tier in Kontakt kommen.

## **Advantage® Lösung zum Auftropfen für Katzen**

---

Das Lösungsmittel in Advantage® kann verschiedene Materialien, z.B. auch Kunststoffe, Leder, Stoffe oder lackierte Oberflächen angreifen. Kontakt des Produktes oder der noch feuchten Auftragungsstelle(n) mit solchen Materialien vermeiden.